

310

PLAGE D'INDICE
280/330

TYPE DE GRAIN
denté vitreux

Sommes de températures base 6°C


semis à floraison : 940-960°C
semis à récolte 32 % MS : 1520-1540°C

MAÏS FOURRAGE S2 - DENTÉ VITREUX

RGT PROVEXX

- Potentiel fourrage
- Fourrage riche en énergie (UFL)
- Grande sécurité (tige et état sanitaire)

Denté
farineux



Denté
vitreux



Corné
denté






À CHAQUE MAÏS SON AMIDON

Cinétique de digestion de l'amidon en fonction du type de grain

Caractérisation du grain

Coupe grain longitudinale



Source Adapté de Philippeau and Michalet-Doreau, 1998



MAÏS CORNÉS DENTÉS

Amidon à dominante vitreuse,
→ Dégradation plus lente de l'endosperme dans les 1^{ères} heures de digestion

MAÏS DENTÉS FARINEUX

Amidon à dominante farineuse,
→ Dégradation plus rapide de l'endosperme dans les 1^{ères} heures de digestion

MAÏS DENTÉS VITREUX

Structure de grain intermédiaire
→ Équilibré entre texture vitreuse et farineuse


+ l'amidon est vitreux



+ sa dégradation dans le rumen est lente

→ Dégradation finale à 48h non affectée

CHOISIR SON MAÏS EN FONCTION DE LA TENEUR EN AMIDON DANS LA RATION



MAÏS CORNÉS DENTÉS

Sécurise les rations > 22 % d'amidon
Limitation du risque d'acidose grâce à une dégradation plus lente de l'amidon. Une partie significative est également digérée dans l'intestin, optimisant ainsi la disponibilité de l'amidon pour l'animal.

MAÏS DENTÉS FARINEUX

Booste les rations < 22 % d'amidon
Digestion plus rapide de l'amidon dans le rumen. Dans le silo, la disponibilité de l'amidon est également plus rapide par rapport à celle des cornés dentés.

MAÏS DENTÉS VITREUX Maïs souples d'utilisation

Équilibrés en amidon vitreux et farineux, vitesse de digestion intermédiaire, pas de restriction dans son utilisation.

PROFIL VARIÉTAL

Inscription 2014

Morphologie

- Plante à bon gabarit
- Port de feuille semi-retombant
- Insertion d'épi moyenne et régulière

Critères agronomiques

- Bonne régularité épis
- Bonne fécondation
- Valeur alimentaire de haut niveau (proche des meilleures variétés cornées)
- Profil fourrage équilibré

Composantes de rendement



Critères sécuritaires

Sécurité tige	
Verse végétative	PS
Verse récolte déchaussement	PS
Verse récolte casse	PS

Sécurité sanitaire

Charbon Ustilago	PS
Helminthosporiose	PS

PERFORMANCES FOURRAGE

Moyenne essais France zones S2

101,8%

Rendements en % des essais
Source RAGT Semences 2014-2015

NATURE DE L'AMIDON



Amidon denté vitreux
RGT PROVEXX
Adapté à toutes les rations

ADAPTATION

Bonnes conditions ++++
Conditions limitantes +++

DSC densité semis conseillée (grs/ha)

Bonnes conditions 95-100 000
Situations limitantes 90-95 000



www.ragt-semences.fr

RAGT Semences • Rue Emile Singla • 12000 Rodez
RCS Rodez 431 899 756 • SAS au capital de 43 475 010 €

Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés RAGT Semences et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. A cet égard les distributeurs conseillent les utilisateurs finaux sur l'utilisation du produit et peuvent leur apporter toute préconisation utile. La responsabilité de RAGT Semences ne saurait être recherchée sur d'autres fondements que ceux de la pureté spécifique, de la faculté germinative et de l'état sanitaire des semences.
Crédits photo : photothèque RAGT Semences.